

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

30 Frs.

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Tél. 88.56.15

**ABONNEMENT
ANNUEL****EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS**

88.06.15

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative rue Dupetit-Thouars - 49043 ANGERS CEDEX

C. C. P. Nantes 86-04-02

BULLETIN N° 23 d'AOUT 1974 -

TOUS DEPARTEMENTS P. 1

ARBRES FRUITIERSCARPOCAPSE DES POIRES ET DES POMMES -

Le deuxième vol est commencé dans la Vallée de la Loire. Il sera relativement important. Les conditions climatiques continuent d'être favorables à la ponte. Par conséquent :

- dans les vergers des départements de Maine-et-Loire, Loire-Atlantique (sauf le Nord), de la Vendée, un nouveau traitement doit être exécuté dans les derniers jours de la semaine en cours.
- dans les vergers du Sud des départements de la Sarthe et de la Mayenne, ce traitement pourra être repoussé aux premiers jours de la semaine du 12 au 17 Août.
- dans les vergers du Nord des départements de la Loire-Atlantique, de la Sarthe et de la Mayenne, il est encore trop tôt pour intervenir. La Station donnera prochainement de nouvelles informations.

Respecter scrupuleusement les délais d'emploi des insecticides avant la récolte. Sur les variétés de poires précoces devant être récoltées avant le 15 Août, il est inutile d'intervenir.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER -

Dans les vergers où des taches existent, il est conseillé d'ajouter un fongicide à la bouillie anti-carpocapse.

ARAIGNEE ROUGE -

L'activité de ce parasite est en recrudescence dans les vergers de poiriers et de pommiers et le niveau des populations tend à augmenter actuellement. Dans les vergers où ce parasite est observé, les arboriculteurs auront intérêt à intervenir avant le dépôt des premiers oeufs d'hiver qui a lieu régulièrement à partir de la deuxième quinzaine d'Août.

PSYLLE DU POIRIER -

Cet insecte demeure présent dans de nombreux vergers, en particulier dans le département de la Vendée. Dans les vergers où ce parasite aura été repéré, on aura intérêt à combattre le carpocapse avec le méthidathion qui est également actif contre le psylle.

PUCERON LANIGERE -

L'activité de cet insecte demeure élevée et il peut nécessiter une intervention dans certains vergers.

TABACMILDIOU -

Le Mildiou du tabac a été **décelé** dans plusieurs communes des départements du Maine-et-Loire et de la Vendée.

Dans ces foyers, les mesures prescrites par les Agents du Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes doivent être appliquées.

Il est rappelé que la lutte contre le Mildiou du tabac a été rendue obligatoire par arrêté préfectoral dans tous les départements. Cet arrêté a prévu des mesures concernant les semis et les plantations : dans les plantations, les plantes ou feuilles atteintes doivent être détruites ou récoltées selon les instructions données aux planteurs par les Agents chargés de la surveillance des plantations. Une circulaire d'application annexée à l'arrêté a précisé quels étaient les traitements à appliquer : les produits à utiliser sont ceux à base de Manèbe, soit en poudrage, soit en pulvérisation; les traitements sont à effectuer à cadences variables (1 à 2 par semaine) selon les conditions météorologiques et la rapidité de croissance du tabac, les Agents chargés de la surveillance de la culture fournissant les conseils nécessaires; les doses de produit commercial à utiliser par hectare varient en fonction du développement de la plante et pourront atteindre jusqu'à 3 kilogrammes de produit commercial à 80 % par hectare.

Enfin, toute personne ayant décelé un foyer de Mildiou est tenue d'en faire la déclaration au Service de la Protection des Végétaux.

Le Chef de la Circonscription
phytosanitaire "PAYS DE LA LOIRE"

J. DIXMERAS.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles :

R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

TIRAGE DU 6 AOUT 1974